

শস্যক্রমের উপকারিতা

সেচ নির্ভর উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু জমিতে রোপা আমন ধান কাটা এবং বোরো ধান রোপণের মধ্যবর্তী ৮০-৯০ দিন স্বাভাবিক অবস্থায় জমি পতিত থাকে। এ সময়ে সরিষা চাষ করে ১ বিঘা জমিতে প্রায় ১০০-১২০ কেজি (প্রায় ২.৫-৩ মণ) সরিষা উৎপাদন করা যায়।

শস্যক্রম চাষের উপযুক্ত এলাকা

সেচ সুবিধা প্রাপ্ত উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু (বর্ষা মৌসুমে ৪০ সেন্টিমিটার বা ১৬ ইঞ্চি গভীরতায় প্লাবিত হয়) জমির জন্য রোপা আমন (বিআর১১/ব্রি ধান৩২/ব্রি ধান৪৯) - সরিষা (বারি সরিষা৯) - বোরো (ব্রি ধান২৮/ব্রি ধান২৯) একটি উপযোগী এবং লাভজনক শস্যক্রম।

চাষ পদ্ধতি

ফসল	বপন সময়	রোপণ সময়
রোপা আমন	আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ	আষাঢ় মাসের শেষ থেকে শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ
সরিষা	২৫ কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ	-----
বোরো	১০ থেকে ১৫ পৌষ (ব্রি ধান২৮) ০১ থেকে ০৫ পৌষ (ব্রি ধান২৯)	২০ থেকে ৩০ মাঘ

- ▶ সরিষার জন্য জমি তৈরির সময় শেষ চাষের সাথে ১ বিঘা জমিতে ১২ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি টিএসপি, ৯ কেজি এমপি এবং ১৫ কেজি জিপসাম মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছে ফুল আসার সময় ১২ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করে প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।
- ▶ সরিষা ফসলে উল্লিখিত পরিমাণ সার প্রয়োগ করলে বোরো চাষের সময় অর্ধেক মাত্রায় টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং পূর্ণ মাত্রায় ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- ▶ ধান চাষের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী স্বাভাবিক নিয়মে করতে হবে।



সরিষা

বোরো ধান

আমন ধান

কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	
অক্টো	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টো

ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@bri.gov.bd

অধিবেশন ৩: মডিউল ৮

ফ্যাক্ট শীট ২