

শস্যক্রমের উপকারিতা

সেচ সুবিধাসম্পন্ন মাঝারি নিচু জমিতে শুধু বোরো (ত্রি ধান২৮/ত্রি ধান২৯) ধানের চাষ হয়ে থাকে। বোরো ধান রোপণের আগে জমি পতিত না রেখে সরিষা চাষ করে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে ১ বিঘা জমিতে প্রায় ১২০-১৫০ কেজি (প্রায় ৩.০-৪ মন) সরিষা উৎপাদন করা যায়।

শস্যক্রম চাষের উপযুক্ত এলাকা

সেচ নির্ভর যে সব মাঝারি নিচু জমি বর্ষা মৌসুমে ৯০ সেমি হতে ১৮০ সেমি (প্রায় ৩-৬ ফুট) গভীরতায় প্লাবিত হয় সে সব এলাকার জন্য সরিষা (টরি৭/বারি সরিষা৯) - বোরো (ত্রি ধান২৮/ত্রি ধান২৯) শস্যক্রমটি অত্যন্ত উপযোগী।

চাষ পদ্ধতি

ফসল	বপন সময়	রোপণ সময়
সরিষা	২০-২৫ কার্তিক	-----
বোরো	২০-২৫ অগ্রহায়ণ	১৫ পৌষের মধ্যে ত্রি ধান২৯ এবং ৩০ পৌষের মধ্যে ত্রি ধান২৮

- ধান চাষের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী স্বাভাবিক নিয়মে করতে হবে।
- সরিষার জন্য জমি তৈরির শেষ চাষের সময় ১ বিঘা জমিতে ১২ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি টিএসপি, ৯ কেজি এমওপি এবং ১৫ কেজি জিপসাম মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। গাছে ফুল আসার সময় ১২ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করে প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।



সরিষা

বোরো ধান

কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	
অক্টো	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টো

ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brii.gov.bd

অধিবেশন ৩: মডিউল ৮

ফসল শীট ৪